

► Cabinet dentaire LUMIÈRE

DRS BERDOUGO et DE VALBRAY

73, cours Albert Thomas 69003 LYON

Tel. : +33 4 72 35 08 45

cabinetdentairelumiere.fr

Les malpositions dentaires


Lorsqu'il y a manque de place ou excès d'espace dans la bouche, les dents risquent de se développer dans de mauvaises positions.

Les dents se placent alors comme elles le peuvent, avec un risque de chevauchement, d'écartement excessif, de bécane entre les deux arcades.

Certaines dents seront trop en avant ou trop en arrière. L'éruption de l'une sera gênée par la présence d'une autre. Un recouvrement partiel de deux dents pourra se former, ...

QUELS RISQUES ?

- > Préjudice esthétique évident.
- > Pression inégale à la mastication : certaines dents travailleront plus que d'autres.
- > Problèmes d'occlusion (fermeture des mâchoires) avec répercussions sur l'ensemble de l'articulation temporo-mandibulaire.
- > Fragilisation (risque de fracture) et usure anormale des dents.
- > Problèmes d'élocution.
- > Morsure des gencives.
- > Hygiène dentaire incomplète : difficultés de brossage, gingivites, voire parodontites.



CAUSES POSSIBLES

- > Une origine congénitale : dysharmonie entre dents et arcades.
- > Un retard dentaire : l'arrivée tardive des dents définitives fait qu'il y a un manque d'espace pour les dernières venues.
- > Une origine fonctionnelle : la position des dents est la résultante de forces s'appliquant dans la bouche (mastication, pression de la langue lors de la déglutition). Des anomalies dans ces fonctions (déglutition infantile avec pression de la langue sur les dents, respiration buccale par exemple) entraînent alors une malposition des dents.

- > Rééducation fonctionnelle (déglutition, élocution, respiration privilégiant le nasal).
- > Extraction de dents temporaires si leur présence prolongée est une gêne.
- > Traitements orthodontiques spécifiques selon l'âge et la malposition.
- > Pose de facettes (malpositions légères chez l'adulte).

SOLUTIONS ET TRAITEMENTS

Les malpositions peuvent être corrigées à différents âges avec un choix de moyens adapté :

- > Abandon du pouce ou de la tétine à un âge raisonnable.

À SAVOIR

Une surveillance régulière des dents des enfants permet d'anticiper les problèmes futurs.

N'hésitez pas à consulter, même pour des malpositions anciennes.